

CITOLOGIA HORMONAL Y ONCOLOGICA ENDO Y EXOCERVICAL (PAP)

1. Preparación previa de la paciente

- i. Se aconseja realizar el estudio en los días 10 a 20 del ciclo.
- ii. No debe haber tratamiento previo con antibióticos, óvulos y/o cremas vaginales tres días antes de la toma de muestra.
- iii. No deben mantenerse relaciones sexuales 24 horas antes de la toma de muestra.
- iv. Se debe haber realizado una higiene de los genitales externos con agua y jabón. No realizar lavajes vaginales internos profundos.

2. Toma de muestra por el médico

- Muestra endocervical
 - i. Realizar una limpieza del flujo vaginal que rodea el canal cervical con torunda de algodón.
 - ii. Insertar citobrush estéril en el canal endocervical y rotar 10 veces para obtener una muestra rica en células.
 - iii. Retirar el citobrush sin tocar las paredes vaginales y realizar el extendido.
 - iv. Fijar el extendido. Rotular como muestra endocervical.
- Muestra exocervical
 - i. Tomar la muestra con espátula de Ayre.
 - ii. Realizar el extendido y fijarlo. Rotular como muestra exocervical.

3. Fijación de extendidos

- i. Puede realizarse con spray citológico o sumergiendo el extendido en alcohol 96° cuando esté casi seco.

4. Datos de la paciente

- i. Consignar datos de la paciente en la orden médica, aclarando el pedido de PAP endo y/o exocervical: FUM, edad, tratamiento hormonal, ciclos anteriores, tratamiento anticonceptivo (indicando el tipo: hormonal, de barrera, DIU) y diagnóstico presuntivo.

5. Entrega en el laboratorio

Horarios de entrega de muestras:

LOMAS: *Lunes a Viernes de 7:30 a 16:30 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs.*

EZEIZA: *Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs*

Demora del resultado: 15 días corridos.