

OXALURIA

1. Suspender durante 48 horas previas a la recolección de la orina la toma de Vitamina C (ácido ascórbico) y la ingesta de alimentos con alto contenido de ácido ascórbico (cítricos), té, mate, café, chocolates, o comer alimentos que contengan oxalato como las espinacas, frutillas y tomates.
2. El tercer día y siguiendo con las indicaciones anteriores, recolectar la orina de 24 horas sobre 20 ml de ácido clorhídrico 6 N provisto por el laboratorio. Comenzar agregando una porción del ácido en la primera botella a utilizar. Volcar la orina directamente sobre el ácido. La otra porción de ácido guardarla para las botellas siguientes. Siempre recolectar la orina **SOBRE** el ácido. Guardar las botellas en la heladera durante la recolección, protegidas de la luz
VER INSTRUCTIVO DE RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS
3. Remitir todo el volumen de orina el mismo día que terminó la recolección.
4. Horarios de entrega de muestras:
LOMAS: *Lunes a Viernes de 7:30 a 16:30 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs.*
EZEIZA: *Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs.*